CLINIQUE HONORÉ CAVE

CENTRE D'OPHTALMOLOGIE

Maladies et Chirurgie des yeux

Docteur Pierre-Julien PHELOUZAT

Diplômé de la Faculté de Toulouse
Ancien assistant des hôpitaux.

Ophtalmologiste
Chirurgie réfractive et greffe de Cornée

Montauban, le 11/03/2025

Madame LEYRAT Nicole
Né(e) le 14/04/1951

CONSIGNES PRE-OPERATOIRE

1. Après avoir vu l'anesthésiste en consultation vous devez vous rendre au secrétariat d'ophtalmologie et demander à effectuer **la Biométrie. *OBLIGATOIRE pour effectuer l'intervention.*** *(Communiquer le nom de votre chirurgien).*
2. **La veille de l'intervention** douche corporelle + cheveux et visage **BETADINE SCRUB 4%**
3. **Venir à jeun le jour de l'intervention.**
4. **BOITE MYDRIATICUM UNIDOSE:** Mettre des gouttes dans l'œil opéré 1h avant d'arriver à la Clinique, et ensuite toutes les 15 minutes jusqu'à votre arrivée à la Clinique.
5. **MYDRIASERT (1boite) : A apporter au personnel soignant de la Clinique.**

CONSIGNES POST-OPERATOIRE

1. Commencez le traitement lendemain matin de l'intervention. Ne pas toucher ou frotter l'œil.

Attention : **OCUFEN unidose** peut provoquer quelques brûlures et/ou picotements passager au moment de l'instillation. N'hésitez pas à le mettre au frigo et à utiliser le **THEALOSE** juste après.

2. Portez la coque pendant 2 jours en permanence (fournie par la clinique).

RECOMMANDATIONS

Les mesures évidentes d'hygiène doivent être respectées lors du retour au domicile (lavage des mains avant collyres et lavage de la coque). **Éviter toutes activités pouvant aboutir à un traumatisme oculaire** la première semaine (ne pas jardiner, ne pas toucher ou frotter l'œil).
Si vous êtes éblouis, portez des lunettes de soleil.

Si au niveau de l'œil opéré un de ces symptômes apparaissait :

- Douleur oculaire,
- Baisse de vision franche et brutale,
- Aggravation de la rougeur oculaire,
- Perception de tâche ou d'éclairs,

Appeler au 05 63 03 03 04 nous vous orienterons si nécessaire pour une consultation en urgence.

AUTRES RECOMMANDATIONS